



Vlaanderen  
is omgeving



# Huisdierwijzer grijze roodstaartpapegaai

▴ Psittacus erithacus

Psittacus timneh

DEPARTEMENT  
OMGEVING

[www.huisdierinfo.be](http://www.huisdierinfo.be)

---

# HUISDIERWIJZER: GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI


*Psittacus erithacus*

*Psittacus timneh*

## INHOUD

<b>1</b>	<b>Overzicht .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Natuurlijk gedrag en behoeften .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Huisvesting en verzorging .....</b>	<b>5</b>
3.1	Huisvesting	5
3.1.1	Gezelschap	5
3.1.2	Kooi of volière	5
3.1.3	Luchtvochtigheid en temperatuur	6
3.1.4	Inrichting van het verblijf	6
3.1.5	Verrijking	7
3.2	Voeding	7
3.3	Dagelijkse verzorging	8
<b>4</b>	<b>Gedrag en omgang met het dier .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Gezondheid .....</b>	<b>9</b>
5.1	Voortplanting en bijhorend gedrag	9
5.2	Meest voorkomende gezondheidsproblemen	10
<b>6</b>	<b>Aankoop of adoptie.....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Kosten .....</b>	<b>12</b>

# 1 OVERZICHT



## 2 NATUURLIJK GEDRAG EN BEHOEFTE

Grijze roodstaartpapegaaien worden 30 tot 35 cm groot en komen voor in Midden- en West-Afrika. Deze vogels zijn ondernemend en zeer intelligent. Ze leven in groepen aan de rand van het regenwoud, waar ze overdag voedsel zoeken in de bomen en op de grasvlaktes van de savanne. 's Nachts slapen ze in nesten in holle bomen. Hun voeding bestaat uit allerlei soorten zaden, noten, planten en vruchten. Soms eten ze ook insecten.

Het zijn erg sociale dieren die een koppel voor het leven vormen, maar ook vriendschappen onderhouden met de andere vogels in de groep. Elk koppel heeft een eigen territorium rond het nest en bij hun slaapboom, dat ze fel verdedigen.

De vogels maken verschillende geluiden, van zacht fluiten tot krijsen. Ze kunnen ook geluiden nabootsen en menselijke taal begrijpen. Grijze roodstaartpapegaaien staan erom bekend de best sprekende papegaaiensoort te zijn.

Er zijn twee soorten van de grijze roodstaartpapegaai, nl. de gewone grijze roodstaartpapegaai (*Psittacus erithacus*) en de Timneh grijze roodstaartpapegaai (*Psittacus timneh*). Vroeger werden deze als ondersoorten beschouwd en werd de gewone grijze roodstaartpapegaai ook wel de Congolese grijze roodstaartpapegaai of Congo grijze roodstaartpapegaai genoemd. De gewone grijze roodstaart heeft grijze veren, een zwarte snavel en een felrode staart. Deze soort is het meest gehouden in gevangenschap. De Timneh grijze roodstaart is kleiner en heeft een donkergrijze met bruin-roze snavel en een oranje-bruine staart.



Links de gewone grijze roodstaart, rechts de Timneh grijze roodstaart.

Met een goede verzorging kunnen ze tot 60 jaar oud worden.

### Indeling in het dierenrijk

<b>Rijk</b>	<i>Animalia</i> (Dieren)
<b>Stam</b>	<i>Chordata</i> (Chordadieren)
<b>Klasse</b>	<i>Aves</i> (Vogels)
<b>Orde</b>	<i>Psittaciformes</i> (Papegaaiachtigen)
<b>Familie</b>	<i>Psittacidae</i> (Papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld)
<b>Soort</b>	<i>Psittacus erithacus</i> en <i>Psittacus timneh</i>

## 3 HUISVESTING EN VERZORGING

### 3.1 HUISVESTING

#### 3.1.1 Gezelschap

Grijze roodstaartpapegaaien hou je bij voorkeur in een koppel of groep. De combinatie man-vrouw gaat het beste. Als er zich eenmaal een koppel heeft gevormd, dan hou je de dieren hun hele leven samen. Alle dieren hebben echter hun eigen voorkeur en worden niet zomaar vrienden.


Geef iedere vogel of koppel een eigen kooi of nachthok en laat de vogels dagelijks samen los in een neutrale kamer of volière. Zo boots je de natuurlijke levensstijl na, waarbij de vogels overdag in groep naar voedsel zoeken en zich 's nachts in hun eigen nestholte terugtrekken. Hou er rekening mee dat de dieren hun eigen nachthok als hun territorium beschouwen en dat ze daar vaak geen vreemde vogels (of handen) willen hebben.



#### 3.1.2 Kooi of volière

Grijze roodstaartpapegaaien kan je binnen of buiten huisvesten, in een ruime kooi of volière. De vogels moeten dagelijks kunnen vliegen. Hoe groter de kooi of volière dus is, hoe beter. Standaardkooien uit de dierenwinkel zijn meestal te klein! Het voordeel van een grote volière is dat de vogels genoeg lichaamsbeweging krijgen en je dus minder tijd moet vrijmaken om ze buiten de kooi los te laten vliegen.

Voor een koppel is een volière van minimaal 200 cm x 200 cm x 200 cm (lengte x breedte x hoogte) nodig. Voor meerdere koppels heb je minstens dubbel zoveel ruimte nodig. Vogels met een nest kunnen erg territoriaal zijn, dus geef ze beter per koppel één volière. Voor één vogel heb je een kooi van minstens 120 cm x 80 cm x 100 cm (lengte x breedte x hoogte) nodig, maar overdag moet de vogel dan wel los kunnen vliegen, klimmen en op onderzoek gaan in huis of in een veilig ingerichte kamer. Als je de dieren los laat vliegen, doe dan de gordijnen (en ramen!) dicht, anders kunnen ze per ongeluk tegen het raam vliegen of ontsnappen.



Naast de grootte van het verblijf is verrijking ook heel belangrijk. Grijze roodstaartpapegaaien zijn zeer intelligent, onderzoek wijst uit dat hun intelligentie vergelijkbaar is met die van een kind van vier jaar oud. Ze vervelen zich snel in een saaie omgeving en hebben veel stimulatie nodig. De vogels klimmen graag en daarom zijn dwarse tralies aangeraden.

In huis is de plaats van de kooi cruciaal voor de gezondheid van de vogels. Zet de kooi niet bij een warmtebron of in volle zon, maar zorg voor een plaats met deels zon en deels schaduw. Grijze roodstaartpapegaaien worden ziek van tocht. Lawaai en harde geluiden (zoals van een wasmachine) kunnen de vogels bang maken. Tijdens het koken kunnen voor vogels giftige dampen ontstaan, dus zet de kooi niet in de keuken. Ook rook, parfum en luchtverfrissers irriteren grijze roodstaartpapegaaien erg. Ga dus op zoek naar een lichte en geurvrije omgeving in of aan je huis om de grijze roodstaart te huisvesten. Zet de kooi best in de ruimte waar je zelf ook veel bent of waar ze door een raam kunnen kijken.

### 3.1.3 Luchtvochtigheid en temperatuur

Grijze roodstaartpapegaaien hebben een luchtvochtigheid van 60 tot 70% nodig. In huis is het vaak te droog. Wanneer je ze in huis houdt, dan kan je ervoor kiezen de tamme vogels dagelijks mee in de badkamer te nemen tijdens het douchen, omdat daar de luchtvochtigheid wel goed is. Voor minder tamme vogels is het belangrijk dat je ze dagelijks besproeit met verneveld water van de plantenspuit of in een kamer zet waar je de luchtvochtigheid hoog houdt. Zorg in de buitenvolière voor een verwarmd binnenhok (15- 20° C) met een luchtbevochtiger.

Een buitenvolière moet deels overdekt en afgeschermd zijn tegen weersinvloeden zoals wind en regen. Zorg dat ze beschut zitten en dat er zeker geen tocht is. De gehele volièr overdekken is niet nodig, omdat ze in de zomer de zon en een regendouche wel prettig kunnen vinden. Grijze roodstaartpapegaaien kunnen niet goed tegen de kou, voorzie daarom een (verwarmd) binnenverblijf. Voorkom extreme droogte of koude.

### 3.1.4 Inrichting van het verblijf

In de volièr of kooi moeten de volgende zaken aanwezig zijn:

- Een nestkast, als schuil- en slaapplek. Voorzie per koppel een eigen nestkast van 30 cm x 30 cm x 50 cm (lengte x breedte x hoogte).
- Zitstokken, met verschillende diktes en structuren om de nagels en poten gezond te houden
- Voldoende vliegruimte
- Een drinkbak
- Een bad om in te baden. Zet dit op een plaats waar er geen mest in kan vallen.
- Een bak met grit, sepia en maagkiesel voor een goede vertering en calciumopname
- Een stofvrije bodembedekking zoals kattenbakkorrels, zeoliet, maïskorrels, beukensnippers of schelpenzand
- Speelgoed, touw, papier en voederpuzzels
- Takken van wilg, vlierbes of fruitbomen worden op prijs gesteld als nest- en verrijkmateriaal.



Zitstokken zijn één van de belangrijkste aspecten bij het inrichten van een verblijf. Bij voorkeur gebruik je natuurlijke takken die variëren in dikte en diameter. Het totaal aantal zitstokken moet groter zijn dan het aantal vogels in de volièr. Door minstens twee zitstokken te voorzien op het hoogste punt, voorkom je competitie. Zorg ervoor dat een koppel samen kan zitten. De zitstokken mogen niet te dicht tegen het plafond worden opgesteld, en de vogels moeten kunnen zitten zonder de muren of andere inrichting te raken. Zorg dat er altijd voldoende open vliegruimte behouden blijft. Oriënteer meerdere relatief korte zitstokken naar verschillende richtingen, zowel horizontaal als verticaal, en plaats ze op andere hoogtes, zodat de papegaaien de omgeving vanuit verschillende oogpunten kunnen overzien en kunnen klimmen. De zitstokken kunnen met bouten of door middel van v-vormige houders aan de volièremuren bevestigd worden. Dit laat ook regelmatige rotatie en vervanging toe. Onthoud dat de houten zitstokken maar een beperkte tijd meegaan, want de vogels houden van knagen. Metalen zitstokken zijn echter niet aangeraden, vooral niet in buitenhuisvesting tijdens de koude wintermaanden.





Je kan planten zetten in de volière, maar de dieren zullen eraan knabbelen. Kies voor veilige planten, die niet aantrekkelijk zijn om aan te knagen. Voorzie voldoende ander knaagmateriaal, zoals zacht hout van takken van de wilg, hazelaar, vlierbes of van onbespoten fruitbomen.

Geef elke dag vers drinkwater uit een waterbak. Het voeder kan je in een ondiepe stenen schaal geven en moet op minstens evenveel plaatsen ter beschikking worden gesteld als er vogels zijn, om agressie over het voedsel te voorkomen.

### 3.1.5 Verrijking

De vogels hebben een grote behoefte om te leren en ontdekken, en vervelen zich snel. Laat hen meekijken, voelen en meedoen met alles wat je doet. Communiceer met hen alsof je met een kind van vier praat. Noem alles bij naam, kleur en vertel wat je doet of gaat doen.

Zorg ervoor dat het verblijf én de kamer waarin ze vrij mogen vliegen ingericht zijn met klimbomen, speelgoed, touwen, knaagmateriaal... Ideeën ter verrijking zijn:

- Geef materialen om te onderzoeken zoals kinderspeelgoed, karton, diversen materialen...
- Geef gras (met zaden) en wilgen of fruitboomtakken met bladeren.
- Laat hen nieuwe ruimtes, klimbomen, touwen, dozen, etc. verkennen.



Om verveling te voorkomen, kan je een deel van het voer aanbieden als voedselverrijking. Het voordeel is dat de vogel over langere tijd altijd kleine porties eet en zo bezig blijft. Er zijn tal van commerciële voederpuzzels verkrijgbaar in de handel, maar je kan ook zelf knutselen om het voer op een activerende manier aan te bieden:

- Zaden in de ribbels van karton schuiven of, voor sterkere vogels, in karton vouwen.
- Fruit- en groentenbrochettes maken: fruit en groenten aan een stevige metalen draad of touw rijgen en aan het plafond van de volière of op een andere moeilijk te bereiken plaats hangen.
- In de zomer noten in fruitsap invriezen en in kommen met water plaatsen, zodat ze kunnen 'vissen'.
- Noten uitstrooien.
- Noten met schil geven, waarin je eventueel een klein gaatje maakt om de vogel te helpen.
- Fruit op kleine takken spietsen en dat verspreid over de kooi hangen.
- Een gat boren in een boom en daarin enkele meelwormen of noten steken.

## 3.2 VOEDING

Grijze roodstaartpapegaaien eten zaden, noten, fruit en (groenten-) bladeren. Voer ze iedere dag een mix van groenten (broccoli, paprika, ...), fruit (appel, pruim, ...) en een zadenmengeling. Als je merkt dat ze alleen de lekkerste zaden uit het voer pikken, dan kan je beter een compleet pelletvoer geven, dat in gespecialiseerde winkels te koop is. Een dieet van alleen zaden zorgt voor tekorten en wordt afgeraden. Eenzijdig voeren kan de vogel ziek maken. Afwisseling met fruit, groenten en noten is zeer belangrijk voor de gezondheid. Laat de vogels geleidelijk wennen aan vers voer door ze kleine stukjes fruit en groenten te geven. Als de mest goed blijft, dan kan je na enkele dagen iets meer vers voer geven.

Ongezouten macadamianoten, palmpitten, hele walnoten en stukjes kokosnoot zijn een goede aanvulling op het voer. Voer geen aardnoten (pinda's), want die bevatten soms dodelijke schimmels. Eens per twee weken mogen er ook insecten gegeven worden. Jonge en magere vogels en kweekdieren mogen steeds eivoer ter beschikking hebben. Als het borstbeen uitsteekt of puntig voelt dan is de vogel te mager. Andere vogels geef je maximaal 20% van de complete voeding in eivoer.





Vraag advies aan een vogeldierenarts als de vogel te dun of te dik is.

Geef het vers voedsel in grote voederschalen van aardewerk of metaal en plaats deze op verschillende locaties in het verblijf. Voorzie voor elk dier een voederschaal. Vers drinkwater moet steeds ter beschikking staan, dit kan je aanbieden in een ondiepe schaal.

### 3.3 DAGELIJKSE VERZORGING

#### Dagelijks

- Geef in de voormiddag nieuw voer en kijk hoeveel er gegeten is.
- Verwijder 's avonds de groenten- en fruitresten.
- Maak eventueel nieuwe voederpuzzels in orde en geef nieuwe takken en speelgoed.
- Geef proper water in de drinkbak en het bad.
- Geef de vogels aandacht, laat ze losvliegen of geef ze verrijking in de kooi/volière.
- Bekijk of de vogels zich normaal gedragen.

#### Minstens eenmaal per week

- Gooi alle vuile bodembedekking weg en reinig de kooi of volièr grondig.
- Was ook de stokken, touwen en het speelgoed goed af.
- Controleer of er nog genoeg grit en maagkiezel is.
- Controleer de nagels, veren en de algemene gezondheid van de vogels.
- Ga indien van toepassing met de stofzuiger rond de kooi, want vogels produceren veel stof en gooien soms ook zand en afval uit de kooi.

#### Een aantal keer per jaar

- Behandel de kooi of volièr een aantal keren per jaar tegen parasieten zoals mijten. Haal de vogels er vooraf uit, want ze zijn erg gevoelig voor toxische stoffen. Haal de hele kooi leeg om alles goed proper te maken. Goede hygiëne is nodig om longproblemen door stof te voorkomen, zowel bij mens als dier. Reinig met heet water, en ontsmet met een javel- of chlooramide-oplossing van 10%. Spoel alles goed na om ook de inname van chloor te voorkomen. Als je met azijn reinigt, moet je de ruimte zeer goed verluchten. Azijn en azijndampen zijn immers zeer giftig voor vogels. Ze hebben een invloed op hun kalkopname en zijn daarom mogelijk dodelijk. Voorkom dus absoluut de inname van azijn.
- Vervang ook regelmatig de touwen en takken, want daarin kunnen parasieten gaan zitten en de ruwe oppervlaktes zijn moeilijk te reinigen.

## 4 GEDRAG EN ONGANG MET HET DIER

Grijze roodstaartpapegaaien zijn intelligente, maar soms moeilijke huisdieren, die veel aandacht vragen. Bedenk dat het houden van grijze roodstaartpapegaaien veel tijd kost en dat het een uitdaging kan zijn om ze een voldoende stimulerende leefomgeving aan te bieden. Als het dier in een kooi gehouden wordt, moet hij zeker 3 tot 4 uur per dag kunnen losvliegen en bezig gehouden worden. Door hun intelligentie hebben ze nood aan prikkels die de leergierigheid stimuleren. Laat ze daarom op een ontspannen manier met allerlei dagelijkse zaken kennismaken.

Gestreste dieren worden depressief en gaan verenplukken of schreeuwen. Hiermee geeft het dier aan dat het zich verveelt, alleen voelt of bang is. Grijp meteen in als je deze signalen opmerkt, want het is een duidelijk teken dat er iets mis is. Pas de leefomgeving aan, om aan de behoeften van je dier tegemoet te komen.

Tijdens de eerste levensmaanden zal het dier vriendelijk zijn tegen iedereen, maar vanaf dat ze zeven maanden tot vier jaar oud zijn, komt het dier in de puberteit en ontwikkelt het zijn karakter. In deze periode kiest het dier ook een levenspartner. Wanneer ze een partner hebben gekozen, dan willen ze daar het liefst de hele tijd bij zijn. Het komt ook voor dat een grijze roodstaartpapegaai een mens als levenspartner kiest. Veel mensen vinden dit leuk, maar het heeft ook nadelen. Het kan voor problemen zorgen als het dier zich wil voortplanten, als je vaak weg bent of vrienden op bezoek hebt. Het dier kan jaloers of agressief reageren op andere dieren, op gezinsleden of op je bezoek. Dit is ook de reden dat grijze roodstaartpapegaaien vaak al meerdere keren doorverkocht zijn voordat ze vier jaar oud zijn, wat een grote impact heeft op de dieren.



De vogels gaan graag op onderzoek buiten de kooi en komen dan graag bij jou. Doe dit enkel binnenshuis, anders kan de vogel wegvliegen! Om de vogel terug in de kooi te krijgen nadat hij los heeft gevlogen in huis, kan je lekker voer in de kooi leggen. Als ze de kooi als een veilig thuis beschouwen, zullen ze er ook gemakkelijk naar terugkeren. Het is beter de vogels niet zindelijk te maken omdat ze dan hun mest te lang ophouden en gezondheidsproblemen kunnen krijgen. In huis zullen grijze roodstaartpapegaaien in alles bijten en mogelijk dingen stuk maken. Dit hoort erbij en is normaal gedrag, de dieren onderzoeken met hun snavel. Voorzie daarom spullen waarin ze wel mogen bijten door bijvoorbeeld touwen en takken op te hangen. Ook het geluid van grijze roodstaartpapegaaien kan overlast veroorzaken. Het is goed om een vaste dagroutine

aan te nemen en ze voldoende afleiding en verrijking te geven. Geef bijvoorbeeld elke dag ander speelgoed en gebruik voedselverrijking om de vogels bezig te houden.

Als je de vogel mee naar buiten wil nemen, dan moet die al heel tam zijn. Om te voorkomen dat het dier wegvliegt, kan je een speciaal vogeltuig omdoen, een reiskooi gebruiken of de vogel kortwieken. Het voordeel van het vogeltuig is dat de vogel zijn complete vleugels kan behouden en in huis los kan blijven vliegen. Het nadeel is dat het tuig de vogel kan irriteren en de vogel al zeer tam moet zijn om het om te laten doen. Het nadeel van kortwieken is dat het de vogel voor langere tijd belemmert goed te vliegen, waardoor hij zich erg onzeker en 'gehandicapt' kan voelen. Ga er dus maar vanuit dat je met een vogel niet zomaar de straat op kan.

Wanneer je een bange vogel moet pakken, gebruik dan sterke, dikke handschoenen en neem de vogel en zijn vleugels (tegen het fladderen) vast. Let op, ze kunnen hard en tot bloedens toe bijten. Een andere manier om de vogels te verplaatsen, is ze tot in de nestkast te laten gaan en deze dan compleet mee te nemen in een reiskooi.

Benader de vogels altijd op een rustige en positieve manier. Straf de vogels niet en jaag er ook niet achteraan, want dit zorgt voor stress en maakt ze schuw. Als de vogel iets ongewenst doet, probeer dan de situatie zo te veranderen, dat de vogel minder snel fouten kan maken.

## 5 GEZONDHEID

### 5.1 VOORTPLANTING EN BIJHOREND GEDRAG

Kweek alleen als je voldoende ruimte hebt voor alle vogels of verantwoordelijke nieuwe baasjes voor de jongen hebt gevonden.

De geslachtsverschillen zijn bij grijze roodstaartpapegaaien moeilijk zichtbaar. Het geslacht kan wel door middel van een DNA-test worden vastgesteld. De eerste vier jaar zijn de vogels nog in ontwikkeling en in de puberteit. Tussen vier en zeven jaar worden de dieren seksueel volwassen. In de natuur leven ze in grote



groepen en kiezen ze daaruit een partner voor het leven. In gevangenschap is het vaak lastig om goede koppels te vormen. Dit gaat het beste als je de jonge dieren met meerdere vogels samen in een volière laat leven, zodat ze zelf hun partner kunnen kiezen. Als er zich koppels vormen, dan zet je die apart in een volière om ze een eigen territorium te geven.

Na de paring legt het vrouwelijk dier drie tot vier eieren. De broedtijd is ongeveer 29 dagen. Nadat de eieren zijn uitgekomen blijven de jongen 12 tot 13 weken in de nestkast en worden ze gevoerd door de ouderdieren. Na het uitvliegen zijn de jongen nog 4 tot 5 weken afhankelijk van de ouderdieren om sociale vaardigheden te leren. Het beste gaan de jongen van de grijze roodstaartpapegaai dus pas na 4 à 5 maanden naar een nieuwe eigenaar. Kweekvogels ontbreken vaak sociale vaardigheden als ze jonger bij de ouders zijn weggehaald. Als je wilt kweken kies je het beste voor vogels die bij de eigen ouders zijn opgegroeid, dit wordt 'natuurbroed' genoemd.

Jonge dieren hebben nood aan regelmatig en positief contact met mensen om tam te worden.

## 5.2 MEEST VOORKOMENDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Gezonde grijze roodstaartpapegaaien zijn alert, levendig, hebben propere poten, ogen en snavel en een vol en glad verendek. Een zieke grijze roodstaartpapegaai trekt zich terug en zet de veren bol. Vogels zijn prooidieren en daarom erg efficiënt in het verbergen van tekenen van ziekte. Neem daarom onmiddellijk contact op met een gespecialiseerde dierenarts als je symptomen vaststelt.

Er zijn meerdere ernstige ziekten waarvoor je een vogel op voorhand kan laten testen. Laat jaarlijks een gezondheidsonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerde vogeldierenarts.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen zijn:

- **Vergroeiingen van de poten**  
Symptomen: de poten worden stijf en krom, openstaande schubben, de poten zien wit met schilfers. Dit is meestal het gevolg van te weinig variatie in zitstokken en te weinig beweegruimte. Als de schubben schilferen, dan kan dat wijzen op mijten.
- **Vergroeiingen van de snavel**  
Symptomen: zichtbare schreefgroei van de snavel.  
Dit is meestal het gevolg van eenzijdige voeding, zoals zaden en zonnebloempitten en te weinig hard materiaal. Voorzie knaagmateriaal zoals sepia en onbespoten takken van fruitbomen of wilgen.
- **Gedragsproblemen**  
Symptomen: herhaaldelijk verenplukken, schreeuwen en soms ook agressie naar andere vogels of mensen. Gedragsproblemen komen veel voor bij grijze roodstaarten.  
De vogel voelt zich niet goed. Je kan gedragsproblemen verminderen door tegemoet te komen aan de behoeften van de vogel, zoals mogelijkheid om te vliegen, een soortgenoot, speelgoed en voedselverrijking.
- **Papegaaienziekte – Psittacose**  
Symptomen bij vogels: lusteloosheid, ontstoken ogen, vieze neus, weinig eetlust.  
De papegaaienziekte is zeer besmettelijk voor vogels en mensen. De ziekte is aangifteplichtig en kan ook voorkomen bij vogels die zelf niet ziek lijken. Bij mensen veroorzaakt de ziekte griepsymptomen, ademhalingsproblemen en soms ook een longontsteking. Vogels kunnen (voor de aankoop) getest worden door een gespecialiseerde vogeldierenarts.
- **Snavel- en veerrotziekte – PBF – circovirusinfectie**  
Symptomen: slechte weerstand, allerlei infecties, afbrokkelende snavel, losse veren.  
Behandeling is niet mogelijk, laat de vogel testen voor je hem aankoopt.

- **Interne parasieten.** Bv. wormen  
Symptomen: vermagering, algemene slechte conditie, waterige of gele mest.  
Preventief de kooi goed proper houden. Bij symptomen kan de dierenarts speciale ontwormingsmiddelen voor vogels voorschrijven.
- **Externe parasieten.** Bv. luizen, mijten, schurft  
Symptomen: jeuk, kale plekken, schilfertjes, witte korrelige 'kalkpoten', lusteloosheid.  
Externe parasieten kan je niet altijd voorkomen, mijten zitten soms in hooi of hout. Zorg voor een goede weerstand en ga bij één van de symptomen direct naar de dierenarts.
- **Slechte rui - stokrui**  
Symptomen: lusteloosheid, veren bol zetten, pikken aan de veren.  
Geef extra energierijk voer of vraag een expert om de omgevingsfactoren en voeding te beoordelen.

## 6 AANKOOP OF ADOPTIE

Als je grijze roodstaartpapegaaien wilt houden, dan is kennis over de behoeftes van de soort en het houden van papegaaien noodzakelijk. Het is geen vogel voor beginners. Het zijn zeer intelligente dieren en het kan moeilijk zijn om hen een goede leefomgeving te bieden. Als je slechts één vogel houdt, dan moet je hem elke dag meerdere uren aandacht kunnen geven. Voor de vogels is het beter om ze als koppel of in een groep in een grote volière te houden.

De volgende vragen helpen je over de aankoop van een grijze roodstaartpapegaai na te denken:

- Besef je dat een grijze roodstaartpapegaai wel 60 jaar kan worden en je dus kan overleven?
- Weet je dat je moet kunnen aantonen dat de vogel legaal verkregen is?
- Is er niemand in huis allergisch voor vogels?
- Kan je tegen het (soms heel luide) geschreeuw of zullen de burens daar last van hebben?
- Heb je genoeg ruimte voor een zeer ruime kooi of volière?
- Heb je voldoende tijd voor het onderhoud?
- Heb je de tijd om elke dag enkele uren met de vogels bezig te zijn en ervoor te zorgen?
- Is er iemand die de vogels kan verzorgen als je op vakantie gaat?
- Begrijp je dat de vogels niet zindelijk zijn als je ze laat losvliegen in huis?
- Heb je ongeveer 25 tot 50 euro per maand per dier over voor de voeding en verzorging?

Je kan grijze roodstaartpapegaaien kopen bij kwekers, een gespecialiseerde dierenwinkel en soms ook adopteren bij een vogelopvang. Alle overdrachten (aankopen, verkopen, giften, ...) moeten gebeuren met een CITES EU-certificaat. Voor meer informatie over de registratie kan je terecht bij de [dienst CITES](#) en op [huisdierinfo.be](http://huisdierinfo.be). Als je een tamme vogel wilt, kies dan voor een vogel die in een huishouden opgegroeid is en contact met mensen gewend is. Kies een verkoper bij wie de dieren er gezond uitzien, het verblijf en water proper zijn, de dieren veel zit- en nestplekken hebben en er voldoende ruimte is in het verblijf. Als je een goed koppel wil, dan laat je de vogels zelf hun partner kiezen uit een groep.

Wees kritisch en durf vragen te stellen. Als koper ben je verantwoordelijk voor een goede keuze. Kies een gezonde vogel, met een compleet verenkleed, die al zelfstandig eet. Kies geen handopfok-vogels, geïmporteerde of zwakke dieren, want daarmee hou je foutieve handel in stand. In de jaren '80 en '90 zijn heel veel vogels uit het wild gevangen, waardoor de populaties in de natuur kwetsbaar zijn. Koop dus zeker geen wildvang, of jongen van wildvangdieren. Handopfok-vogels krijgen sneller gedragsproblemen. Vogels die door hun ouders zijn opgevoed, hebben een betere gezondheid en sociale vaardigheden en worden bovendien even tam. Controleer of de dieren geen verwondingen of vervormingen hebben. Als je verwaarloosde dieren



opmerkt, dan kan je dit melden bij de Dienst Dierenwelzijn op het [Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren](#).

Richt de volière of kooi in voor je de grijze roodstaartpapegaai koopt. Zorg bij de introductie van de dieren in hun verblijf voor veel schuilplaatsen zodat de dieren rustig kunnen wennen. Geef in het begin hetzelfde voer als de vorige eigenaar en laat ze geleidelijk wennen aan een nieuw voer. Als je al vogels hebt, hou je de nieuwe vogel het best drie weken apart om te zien of hij ziektevrij is.

## 7 KOSTEN

Een grijze roodstaart kost 500 tot 900 euro. Een test om het geslacht te bepalen en ziekten uit te sluiten kost 100 tot 200 euro per vogel.

Bij de aankoop heb je een kooi of volière nodig met een nestkast, water- en voerbak, verschillende zitstokken en speelgoed. Deze benodigdheden koop je vanaf 250 euro.

Maandelijks kost de bodembedekking en het voer van een grijze roodstaartpapegaai ongeveer 25 tot 50 euro. Als de vogel ziek wordt, moet je een gespecialiseerde dierenarts raadplegen, en de kosten hiervoor kunnen hoog oplopen.





Koning Albert II laan 20/8  
1000 Brussel  
[www.omgevingvlaanderen.be](http://www.omgevingvlaanderen.be)